

(Standard-)Impfplan für **Reifgeborene ≥ 37 SSW** auf Basis der Impfempfehlung der STIKO (Stand 1/2024)

Impfung	Vollendeter Lebensmonat						Vollendetes Lebensjahr		
	2	3	4	5-10	11-14	15-23	5-6	12-13	15-17
		U4		U5	U6				J1
<b>Rotavirus</b>	1. Impfung	2. Impfung	3. Impfung (nur Rotateq)						
<b>„6fach“</b> -Diphtherie -Tetanus -Pertussis -Hepatitis B -Poliomyelitis -Hämophilus influenzae B (HiB)	1. Impfung		2. Impfung	Abstand mind. 6 Mon. →	3. Impfung (i.d.R. bei U6)		Auffrisch- impfung -Diphtherie -Tetanus -Pertussis	Auffrisch- impfung -Polio	Auffrisch- impfung -Diphtherie -Tetanus -Pertussis (-Polio)
<b>Pneumokokken</b>	1. Impfung		2. Impfung		3. Impfung				
<b>Meningokokken B</b>		1. Impfung		2. Impfung	3. Impfung (zusammen mit Men C)	Nachhol-Impfungen bis 5. Geb.		ab 24 Mon. 2 Impfungen	
<b>Meningokokken C</b> (ggf. als ACWY)					Impfung (ca. 8 Wo n. U6)				
<b>„4-fach“</b> -Masern -Mumps -Röteln -Varizellen					1. Impfung (ca. 4 Wo n. U6)	2. Impfung (ca. 12 Wo n. U6)			
<b>Hum. Papillomaviren (HPV)</b>							9-14 J.: 2 Impfungen 0 - 6 Mon. ----- 15-17 J.: 3 Impfungen 0 -2 - 6 Mon.		

