

(Standard-)Impfplan für **Frühgeborene < 37 SSW** auf Basis der Impfempfehlung der STIKO (Stand 1/2024)

Impfung	Vollendeter Lebensmonat						Vollendetes Lebensjahr		
	2	3	4	5-10	11-14	15-23	5-6	12-13	15-17
		U4		U5	U6				J1
Rotavirus	1. Impfung	2. Impfung	3. Impfung (nur Rotateq)						
„6fach“ -Diphtherie -Tetanus -Pertussis -Hepatitis B -Poliomyelitis -Hämophilus influenzae B (HiB)	1. Impfung	2. Impfung	3. Impfung	Abstand mind. 6 Mon. →	3. Impfung (i.d.R. bei U6)		Auffrisch- impfung -Diphtherie -Tetanus -Pertussis	Auffrisch- impfung -Polio	Auffrisch- impfung -Diphtherie -Tetanus -Pertussis (-Polio)
Pneumokokken	1. Impfung	2. Impfung	3. Impfung		3. Impfung				
Meningokokken B		1. Impfung (ggf. 2 Wo später)		2. Impfung	3. Impfung (zusammen mit Men C)	Nachhol-Impfungen bis 5. Geb.		ab 24 Mon. 2 Impfungen	
Meningokokken C (ggf. als ACWY)					Impfung (ca. 8 Wo n. U6)				
„4-fach“ -Masern -Mumps -Röteln -Varizellen					1. Impfung (ca. 4 Wo n. U6)	2. Impfung (ca. 12 Wo n. U6)			
Hum. Papillomaviren (HPV)							9-14 J.: 2 Impfungen 0 - 6 Mon. ----- 15-17 J.: 3 Impfungen 0 -2 - 6 Mon.		

